

Клинические рекомендации МЗ РФ

«Нарушения липидного обмена», 2023г.³

Риск	ЦУ ХС-ЛНП (ммоль/л)	Определение
ОЧЕНЬ ВЫСОКИЙ	<1,4 и снижение ≥50% от исходного	Документированное атеросклеротическое ССЗ, клинически или по результатам обследования, включая ОКС, ИБС, ЧКВ, КШ или другие операции на артериях, инсульт/ТИА, поражения периферических артерий - Атеросклеротическое ССЗ по данным обследований – значимая АСБ (стеноз >50%) - СД + поражение органов-мишеней, ≥3 ФР, а также раннее начало СД с длительностью >20 лет % ХБП с СКФ <30 мл/мин/1,73 м² - СГХС в сочетании с ФР - SCORE2 ≥7,5% (<50 лет), ≥10% (50–69 лет), ≥15% (≥70 лет)
ВЫСОКИЙ	<1,8 и снижение ≥50% от исходного	- Значимо выраженный ФР – ОХС >8 ммоль/л и/или ХС ЛНП ≥4,9 ммоль/л и/или АД ≥180/110 мм рт. ст. - СГХС без ФР - СД без поражения органов-мишеней, СД ≥10 лет или с ФР ХБП с СКФ 30–59 мл/мин/1,73 м² - Гемодинамически незначимый атеросклероз некоронарных артерий (стеноз(-ы) >25–49%) - SCORE2 2,5%–7,5% (<50 лет), 5–10% (50–69 лет), 7,5–15% (≥70 лет)

АГ – артериальная гипертензия, ХБП – хроническая болезнь почек, СКФ – скорость клубочковой фильтрации, ТИА – транзиторная ишемическая атака, ССЗ – сердечно-сосудистые заболевания, АСБ – атеросклеротическая бляшка, СГХС – семейная гиперхолестеринемия, ФР – фактор риска, ХС-ЛНП – холестерин липопротеинов низкой плотности, АД – артериальное давление, СД – сахарный диабет, ОКС – острый коронарный синдром, ИБС – ишемическая болезнь сердца, ЧКВ – чрескожное коронарное вмешательство, КШ – коронарное шунтирование.

Адаптировано из: Клинические рекомендации. Нарушения липидного обмена. Одобрено Научно-практическим советом Минздрава РФ. [Электронный ресурс] URL: Рубрикатор КР (minzdrav.gov.ru) (дата доступа 16.02.2023).

Информация предназначена исключительно для медицинских и фармацевтических работников.