

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

ФЕРТИНА:

ПРИ ОТЛОЖЕННЫХ РЕПРОДУКТИВНЫХ ПЛАНАХ

- **Функциональные нарушения менструального цикла:**
2-4 ПАКЕТИКА В СУТКИ ВО ВРЕМЯ ЕДЫ НЕ МЕНЕЕ 6 МЕСЯЦЕВ
- **СПКЯ/Мультифолликулярные яичники:**
ПО 4 ПАКЕТИКА В СУТКИ ВО ВРЕМЯ ЕДЫ НЕ МЕНЕЕ 6 МЕСЯЦЕВ

ФЕРТИФОЛИН:

ПРИ ПОДГОТОВКЕ К БЕРЕМЕННОСТИ

- **Функциональные нарушения менструального цикла:**
4 ПАКЕТИКА В СУТКИ ВО ВРЕМЯ ЕДЫ ОТ 3 ДО 6 МЕСЯЦЕВ
- **СПКЯ/Мультифолликулярные яичники:**
ПО 4 ПАКЕТИКА В СУТКИ ВО ВРЕМЯ ЕДЫ НЕ МЕНЕЕ 6 МЕСЯЦЕВ
- **Подготовка к программам ВРТ/ЭКО:**
ПО 4 ПАКЕТИКА В СУТКИ ВО ВРЕМЯ ЕДЫ ЗА 3 МЕСЯЦА
ДО И ВО ВРЕМЯ ЛЕЧЕБНОГО ЦИКЛА
- **Поддержка обмена глюкозы у беременных:**
ПО 4 ПАКЕТИКА В СУТКИ ДО И ВО ВРЕМЯ БЕРЕМЕННОСТИ

ИНФОРМАЦИЯ ПРЕДНАЗНАЧЕНА ДЛЯ МЕДИЦИНСКИХ
И ФАРМАЦЕВТИЧЕСКИХ РАБОТНИКОВ
БАД НЕ ЯВЛЯЕТСЯ ЛЕКАРСТВЕННЫМ СРЕДСТВОМ

ВОЗВРАЩАЙ ГОРМОНАМ РИТМ, А СЕБЕ - РАДОСТЬ ЖИЗНИ!



VALENTA
Фармацевтическая
компания


ФЕРТИНА



ПРИ ОТЛОЖЕННЫХ
РЕПРОДУКТИВНЫХ ПЛАНАХ

РЕГУЛЯРНЫЙ ПРИЕМ ФЕРТИНЫ:

- Восстанавливает менструальный цикл за счет нормализации баланса половых гормонов
- Поддерживает чувствительность клеток к инсулину



[Инозитол + фолиевая кислота]

ФЕРТИФОЛИН





ПРИ ПОДГОТОВКЕ К БЕРЕМЕННОСТИ

Метафолин® – активная форма фолиевой кислоты, которая усваивается даже у женщин с нарушением метаболизма фолиевой кислоты³

ЭФФЕКТЫ ПРИМЕНЕНИЯ КОМБИНАЦИИ Мио-инозитола и Метафолина³:

- Повышает вероятность наступления беременности¹
- Поддерживает репродуктивную функцию яйцеклеток¹
- Содействует поддержанию физиологического развития нервной трубки у плода²



[Инозитол + Метафолин³]

1. Brusco G.F., European Review for Medical and Pharmacological Sciences. 2013; 17: 3095-3102. 2. Громова О.А., Consilium Medicum №06 2012. 3. Метафолин является зарегистрированным товарным знаком компании Merck KGaA, Дармштадт, Германия.

БАД, НЕ ЯВЛЯЕТСЯ ЛЕКАРСТВЕННЫМ СРЕДСТВОМ