

# ЛЕЧЕНИЕ БАКТЕРИАЛЬНЫХ ОКИ:

## антиセптики или системные антибиотики?

ВОЗ (Всемирная Организация Здравоохранения)  
Информационный бюллетень №330, апрель 2013 г<sup>1</sup>:


...Обычно диарея является симптомом инфекции кишечного тракта, которая может быть вызвана различными бактериями, вирусами и паразитами...

В мире ежегодно диареями страдают **более 1 млрд человек**, из которых **65-70% составляют дети в возрасте до 5 лет.**

## ВОЗБУДИТЕЛИ ОКИ БАКТЕРИАЛЬНОЙ ЭТИОЛОГИИ:



Сальмонеллы встречаются чаще всего<sup>2</sup>




Диареегенные E. coli – от 4,8% до 10,3%



Иерсинии 0,9%<sup>2</sup>

(при сочетании с другими возбудителями ОКИ)<sup>2</sup>



Шигеллы 0,3%<sup>2</sup>



Кампилобактерии 2,9-5%<sup>2</sup>



Смешанные формы от 7,3 до 40%<sup>2</sup>

## ЛЕЧЕНИЕ ОКИ<sup>2</sup>:



ДИЕТОТЕРАПИЯ;



РЕГИДРАТАЦИОННАЯ ТЕРАПИЯ;



ЭТИОТРОПНАЯ ТЕРАПИЯ

(антибактериальная – только при холере, брюшном тифе, шигеллезе и амебиазе (ВОЗ));



ВСПОМОГАТЕЛЬНАЯ ТЕРАПИЯ (энтеросорбция).

## ПРЕИМУЩЕСТВА КИШЕЧНЫХ АНТИСЕПТИКОВ ПО СРАВНЕНИЮ С СИСТЕМНЫМИ АНТИБИОТИКАМИ<sup>2</sup>:



Возможность непосредственного воздействия на бактериальный агент



Низкий риск развития резистентности штаммов;



Практически полное отсутствие негативного влияния на нормальную микрофлору;



Незначительная частота развития системных побочных реакций.



Не влияет на состав нормальной бактериальной флоры пищеварительного тракта<sup>3</sup>.



Не вызывает возникновение лекарственноустойчивых штаммов, не наблюдалась также перекрестная устойчивость с другими противобактериальными препаратами<sup>3</sup>.

Эффективность действия не зависит ни от pH, существующего в просвете кишечника, ни от чувствительности микроорганизмов к антибактериальным препаратам<sup>3</sup>.



Препарат практически не вс�ывается из пищеварительного тракта, действует исключительно в просвете кишечника<sup>3</sup>.

Стопдиар можно включать в терапию ОКИ, не дожидаясь результатов лабораторных исследований, когда на основании клинических данных можно предположить бактериальную и смешанную этиологию заболевания<sup>2</sup>.

Капсулы 200 мг №12

Для детей с 3-х лет и взрослых

Суспензия 90 мл 220мг/5мл

с банановым вкусом

Для детей уже с 1 месяца!



Таблетки 100 мг № 24

Для детей с 3 лет и взрослых



1. Информационный бюллетень ВОЗ №330 Апрель 2013 г. [http://www.who.int/mediacentre/factsheets/fs330\\_ru](http://www.who.int/mediacentre/factsheets/fs330_ru).

2. Бабаян М.Л. Острые кишечные инфекции смешанной этиологии у детей. Экспериментальная и клиническая гастроэнтерология 2016; 133 (9): 66-70

3. Инструкция по применению препарата Стопдиар