

# ОРВИ ПАТОГЕНЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ТЕРАПИИ

ИНФИЦИРОВАНИЕ

РАЗМНОЖЕНИЕ ВОЗБУДИТЕЛЕЙ В КЛЕТКАХ ЭПИТЕЛИЯ РЕСПИРАТОРНОГО ТРАКТА

ОСТРОЕ ВОСПАЛЕНИЕ

ВЫДЕЛЕНИЕ ПРОВОСПАЛИТЕЛЬНЫХ МЕДИАТОРОВ

чихание  
и насморк

высокая  
температура

**КАШЕЛЬ**

затрудненное  
носовое дыхание

боль  
в горле

- неэффективность мукоцилиарного клиренса
- гиперсекреция слизи
- раздражение окончаний нервов, расположенных на задней стенке глотки, в трахее, бронхах

## КОМПЛЕКСНАЯ ТЕРАПИЯ КАШЛЯ И ДРУГИХ СИМПТОМОВ ОРВИ

### МУКОАКТИВНЫЕ ПРЕПАРАТЫ



## Флуифорт

карбоцистеина  
лизиновая соль

### ДОЗИРОВКИ

**Детям от 1 года до 5 лет** — 2,5 мл сиропа 2–3 раза в день;  
**детям старше 5 лет** — 5 мл сиропа 2–3 раза в день.

мукорегулятор  
непрямого действия

- + Снижает вязкость мокроты, не увеличивая ее объем
- + Уменьшает количество вырабатываемой слизи
- + Улучшает деятельность реснитчатых клеток
- + Восстанавливает структуру слизистой оболочки

**КАРБОЦИСТЕИН  
+ ЛИЗИН**



быстрое и полное  
всасывание препарата



сокращение риска возникновения  
побочных эффектов со стороны ЖКТ



### ДОЗИРОВКИ

#### ВНУТРЬ

**Детям 6–14 лет:** содержимое 1/2 двухобъемного пакетика (по линии с надписью «половина дозы») внутрь 3 раза в день;

**Для детей 14–18 лет** дозировки препарата соответствуют таковым у взрослых.

#### МЕСТНО

**Детям с 12 лет:** По 2 полоскания в сутки, по 10 мл раствора ОКИ на одно полоскание.

## ОКИ

кетопрофена  
лизиновая соль



### НПВП



Быстрое начало  
действия (15–20 мин)



Продолжительность  
эффекта до 8 часов



Хорошая  
переносимость<sup>1,2</sup>



Непревзойденное  
проникновение в ткани  
лимфоцитарного кольца<sup>1</sup>



В 6 раз эффективнее  
бензидамина снимает  
боль и воспаление<sup>2</sup>