


На приеме пациент с остеоартритом

МОРФОЛОГИЧЕСКИЕ ИЗМЕНЕНИЯ НА УРОВНЕ ХРЯЦА И ПОДХРЯЩЕВОЙ КОСТНОЙ ТКАНИ¹



Наличие признаков активного воспалительного процесса и некротических изменений в суставных структурах у пациентов, подвергающихся оперативному вмешательству, требуют дополнительного терапевтического сопровождения в период подготовки к эндопротезированию²

КЛИНИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ АССОЦИАЦИИ РЕВМАТОЛОГОВ РОССИИ, 2016 Г., И ЕВРОПЕЙСКОГО ОБЩЕСТВА КЛИНИЧЕСКИХ И ЭКОНОМИЧЕСКИХ АСПЕКТОВ ОСТЕОАРТРИТА И ОСТЕОПОРОЗА, 2019 Г.:

НАЗНАЧЕНИЕ ДИАЦЕРЕИНА РЕКОМЕНДОВАНО ДЛЯ ЛЕЧЕНИЯ ОА КОЛЕННЫХ И ТАЗОБЕДРЕННЫХ СУСТАВОВ В КАЧЕСТВЕ СИМПТОМАТИЧЕСКОГО СРЕДСТВА ДЛЯ УМЕНЬШЕНИЯ БОЛИ И КАК АЛЬТЕРНАТИВА НПВС ИЛИ ПАРАЦЕТАМОЛУ (ПРИ ПРОТИВОПОКАЗАНИИ К ИХ ПРИМЕНЕНИЮ)

ДИАРТРИН (ДИАЦЕРЕИН)³



РУ ЛП – N(000715)–(P)FBU



Обладает противовоспалительным и анальгетическим действием³

- подавляет активность ИЛ-1, участвующего в воспалении и разрушении хряща
- подавляет активность противовоспалительных цитокинов (ИЛ-6, ФНО-альфа)
- ингибирует фермент NAAA*, усиливающий реакцию клеток на болевые стимулы
- замедляет образование металлопротеиназ, повреждающих хрящевую ткань


Оказывает множественные лечебные эффекты при ОА с сочетанной патологией, в частности, способствует снижению уровня гликированного гемоглобина, ИМТ и уровня СРБ⁴

При длительном приеме стимулирует синтез протеогликанов, структурных компонентов хрящевой ткани³

Обладает благоприятным профилем безопасности, продемонстрированным в международном многоцентровом двойном слепом рандомизированном исследовании³

НАЗНАЧЕНИЕ ДИАРТРИНА (ДИАЦЕРЕИН) В ПРЕОПЕРАЦИОННОМ ПЕРИОДЕ²

Динамика показателей боли (по ВАШ, мм) на фоне длительной терапии Диартрином



Анализ эффективности и безопасности 4-месячного применения диацереина у пациентов с гонартрозом и коксартрозом III–IV стадии, включенных в лист ожидания для тотального эндопротезирования, со сроком предполагаемого хирургического вмешательства более чем через 3–4 месяца

Примечание: NAAA – амидаза N-ацилэтаноламиновой кислоты, ИМТ – индекс массы тела, СРБ – С-реактивный белок, ИЛ – интерлейкин, ОА – остеоартрит.

1. Из личного архива данных Елисеевой Л.Н.
 2. Елисеева Л.Н., Бочарникова М.И., Бледнова А.Ю., Жихарева О.А. Актуальные вопросы выбора базисной терапии остеоартрита. РМЖ. 2021; 10: 36–40.
 3. Инструкция по применению лекарственного препарата для медицинского применения Диартрин, РУ ЛП-002723, дата пересмотра 07.10.2021 г.
 4. Guo S, Guo X, Zhang H, Zhang X, Li Z. The Effect of Diacerein on Type 2 Diabetic Mellitus: A Systematic Review and Meta-Analysis of Randomized Controlled Trials with Trial Sequential Analysis. J Diabetes Res. 2020 Feb 10;2020:2593792. doi: 10.1155/2020/2593792. PMID: 32104712; PMCID: PMC7035565.

M-M-DIA-2023_09-11111145

Подготовлено по выступлению д.м.н., профессора Елисеевой Л. Н. в рамках проекта МЕДэксперт ревматология.

[Смотреть видеозапись](#)

ИНФОРМАЦИЯ ПРЕДНАЗНАЧЕНА ДЛЯ ФАРМАЦЕВТИЧЕСКИХ И МЕДИЦИНСКИХ СПЕЦИАЛИСТОВ

Материал выпущен при поддержке компании ООО «Биннофарм Групп». Адрес местонахождения: РФ, 115114, г. Москва, ул. Кожевническая, д. 14 стр. 5. Контакты для обращения: +7 (495) 646-28-68; infofb@binnopharmgroup.ru