


АЛГОРИТМЫ ТЕРАПИИ ПОДАГРЫ



Предусмотрено назначение уратснижающих препаратов практически всем пациентам с доказанным диагнозом подагры¹.

УРАТСНИЖАЮЩАЯ ТЕРАПИЯ. РЕКОМЕНДАЦИИ АССОЦИАЦИИ РЕВМАТОЛОГОВ РОССИИ АРР (2017)



АЗУРИКС®
Фебуксостат

alium
МНН ФЕБУКСОСТАТ



Эффективность в отношении влияния на сывороточный уровень мочевой кислоты при применении средних доз препаратов превышает таковую у аллопуринола².



Может применяться у больных с мягкой и умеренной почечной недостаточностью².



Способствует:

- достижению и удержанию целевого уровня мочевой кислоты³;
- улучшению показателей качества жизни³;
- улучшению приверженности терапии пациентов с неэффективностью или непереносимостью аллопуринола³.



Чаще, чем аллопуринол, позволяет достигать целевого уровня мочевой кислоты у больных подагрой со сниженной функцией почек².



Хорошо переносится, в том числе у пациентов, для которых предшествующий прием аллопуринола был невозможен из-за нежелательных явлений¹.

1. М. Н. Чикина, М. С. Елисеев, О. В. Желябина. Практическое применение национальных клинических рекомендаций по лечению подагры (предварительные данные). Современная ревматология. – 2020. – Т. 14. – № 2. – С. 97-103. – DOI 10.14412/1996-7012-2020-2-97-103.
2. Подагра. Клинические рекомендации. 2018.
3. М. Н. Чикина, О. В. Желябина, М. С. Елисеев. Влияние уратснижающей терапии на показатели качества жизни у пациентов с подагрой. Современная ревматология. – 2021. – Т. 15. – № 3. – С. 62-68. – DOI 10.14412/1996-7012-2021-3-62-68.

РУ ЛП-004799, последнее изменение 22.06.2021.

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. НЕОБХОДИМО ОЗНАКОМИТЬСЯ С ИНСТРУКЦИЕЙ ПО ПРИМЕНЕНИЮ ИЛИ ПОЛУЧИТЬ КОНСУЛЬТАЦИЮ СПЕЦИАЛИСТА