

# РАБЕЛОК®

рабепразол 10/20 мг таб., лиофилизат 20 мг

ИНГИБИТОР ПРОТОННОЙ ПОМПЫ  
С МОЩНЫМ ПОДАВЛЕНИЕМ  
ГИПЕРСЕКРЕЦИИ СОЛЯНОЙ  
КИСЛОТЫ



Для пациентов с ГЭРБ, язвенной болезнью, хроническим панкреатитом



- Самая быстрая скорость активации
- Превосходит омепразол в подавлении секреции соляной кислоты
- Специальная технология изготовления таблеток

С заботой о Вас...

 **КАДИМА**  
ФАРМАСЮТИКАЛЗ  
ЛИМИТЕД

# РАБЕЛОК®

рабепразол 10/20 мг таб., лиофилизат 20 мг

**ИНГИБИТОР ПРОТОННОЙ ПОМПЫ  
С МОЩНЫМ ПОДАВЛЕНИЕМ  
ГИПЕРСЕКРЕЦИИ СОЛЯНОЙ  
КИСЛОТЫ**

## Способ применения и дозы РАБЕЛОК® 20 мг таблетки

Таблетки РАБЕЛОК® 20 мг принимают внутрь целиком, не разжевывая и не измельчая.  
Время суток и прием пищи не влияют на активность таблеток.

| Показания                                                     | Режим дозирования                                                                                                              | Длительность приема                                                      |
|---------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|
| Язвенная болезнь желудка в стадии обострения                  | 1 таб (20 мг) x 1 раз в день                                                                                                   | 6 нед.<br>Длительность лечения м.б. увеличена еще на 6 нед.              |
| Язвенная болезнь двенадцатиперстной кишки в стадии обострения | 1 таб (20 мг) x 1 раз в день                                                                                                   | 2-4 нед.<br>Длительность лечения м.б. увеличена еще на 2-4 нед.          |
| Эрозивная ГЭРБ, рефлюкс-эзофагит                              | 1 таб (20 мг) x 1 раз в день                                                                                                   | 4-8 нед.<br>Длительность лечения м.б. увеличена еще на 8 нед.            |
| НЭРБ                                                          | 1 таб (20 мг) x 1 раз в день                                                                                                   | 4 нед. Далее по требованию                                               |
| Для эрадикации <i>Helicobacter pylori</i>                     | 1 таб (20 мг) x 2 раза в день                                                                                                  | 7 дней, по определенной схеме с соответствующей комбинацией антибиотиков |
| Синдрома Золингера-Эллисона                                   | 3 таб (60мг) x 1 раз в день. Затем дозу повышают и назначают в дозе до 100 мг в сутки однократно или по 60 мг x 2 раза в сутки | Длительность лечения – до 1 года                                         |



-  **Выраженное подавление секреции соляной кислоты**
-  **Быстрое избавление от изжоги и боли**
-  **Быстрое выздоровление**

Информация предназначена для сотрудников системы здравоохранения



Представительство «Кадила Фармасютикалз Лимитед» (Индия)  
[www.cadilapharma.com/ru](http://www.cadilapharma.com/ru)  
[www.cplrus.ru](http://www.cplrus.ru)  
[www.trigand.com](http://www.trigand.com)  
[www.rabeloc.com](http://www.rabeloc.com)